

8

じんつうそくしんざい 陣痛促進剤 (ยาเร่งคลอด)




出産のとき、自然に体からプロスタグランジンとオキシトシンというものがでて、それらによって陣痛(子宮の収縮)がおこります。

しかし、陣痛がはじまらなかったり、陣痛がはじまったけどよわかったり、ママや赤ちゃんのために早めに出産した方がよい状況のときは、陣痛促進剤がつかわれます。それは、人工的につくったプロスタグランジンとオキシトシンで、点滴することによって、陣痛がはじまったり、陣痛が強くなったりします。

Q: どのような薬ですか？

A: プロスタグランジン: 点滴やのみ薬があります。薬のはたらきは、子宮の出口をやわらかくします。また、強い陣痛がおこることがあります。喘息の人には使えません。



A: オキシトシン: 点滴です。子宮の出口をやわらかくするはたらきはありません。また、弱い陣痛しかおこらないこともあります。

状態にあわせてどちらかの薬が使われます。使い方のルールにあわせて薬は少しずつ使います。


เมื่อถึงเวลาคลอดลูก โดยธรรมชาติร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) และออกซิโทซิน (Oxytocin) กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ (มดลูกบีบรัดตัวมากขึ้น)

แต่ในกรณีแม่ไม่รู้สึกริมเจ็บท้องคลอด, เจ็บท้องเพียงเล็กน้อย, หรือต้องการทำคลอดให้แม่หรือทารกในครรภ์คลอดออกมาเร็วขึ้น เป็นต้น ยาเร่งคลอดจะถูกนำมาใช้ในกรณีเหล่านี้

พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) กับ ออกซิโทซิน (Oxytocin) เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาเลียนแบบ ผ่านการให้แม่ทาน้ำเกลือ จะกระตุ้นให้รู้สึกเริ่มปวดท้องคลอดและปวดแรงแมกขึ้นกว่าเดิม

Q: รูปแบบยาเป็นอย่างไร ?

A: พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) มีทั้งรูปแบบผสมให้ผ่านทางน้ำเกลือและยากิน กลไกการทำงานของยา จะทำให้ปากมดลูกขยายตัว และกระตุ้นให้เจ็บท้องคลอดรุนแรงมากขึ้น และห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคหืด



A: ออกซิโทซิน (Oxytocin) ให้ยาผ่านทางน้ำเกลือ ไม่ได้ออกฤทธิ์ช่วยให้มดลูกขยายตัว แต่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์แต่ไม่รุนแรงมากนัก

การใช้ยาเร่งคลอด ไม่ว่าจะ เป็นยาตัวไหน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวิธีการให้ยา ซึ่งควรให้ครั้งละน้อยๆ



Q: どうして陣痛促進剤をつかうのですか？

A: 赤ちゃんの状態が悪くなっているときは、出産して必要な治療をしたほうがよいため、早く出産するために、陣痛促進剤を使います。

たとえば、陣痛がくるまえに破水したときは、感染をおこすことがあります、それによって赤ちゃんの状態が悪くなることがあります。ママが妊娠高血圧症候群(HDP)や妊娠糖尿病(GDM)などと診断されているときは、ママや赤ちゃんに悪い影響が出ることがあります。予定日からかなりすぎてしまったのに出産にならないときは、赤ちゃんに栄養をおくる胎盤のはたらきが悪くなり、赤ちゃんの状態が悪くなったり、赤ちゃんが大きくなりすぎたりすることがあります。

また、陣痛が弱いままで強くならないときは、出産までに時間がかかり、赤ちゃんの状態が悪くなりますし、ママもとても疲れてしまいます。



Q: 陣痛促進剤の副作用は？

A: 効果が人によって違います。

点滴をしても効果がでないことがあります。あまりないことですが、陣痛促進剤によって陣痛が強くなりすぎたり、子宮が破裂したりする可能性もあります。そうならないために、陣痛促進剤を使うときは、必ずルールに沿って使われています。



Q: ทำไมถึงใช้ยาเร่งคลอด ?

A: ในกรณีที่สุขภาพของทารกกำลังแย่ลง จำเป็นต้องใช้ยาเร่งคลอดช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้แม่คลอดลูกได้เร็วขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น, กรณีถุงน้ำคร่ำแตกก่อนจะเจ็บครรภ์ เด็กอาจมีโอกาสดูดเชื้อได้ หรือ ตก อ ยู่ ส ภ า พ ที่ เป็น อัน ต ร า ย , กรณีแม่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (HDP) หรือ เบา ห ว า น ข ณ ะ ต ั้ง ค ร ร ม (GDM) แม่และเด็กอาจจะได้รับอันตรายเวลาคลอดเองตามปกติได้

กรณีถึงวันครบกำหนดคลอดแล้วทารกยังไม่คลอด โดยมีสาเหตุมาจากรกในครรภ์ทำงานส่งสารอาหารไปเลี้ยงไม่ดีพอ, ภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์แย่ง, ทารกตัวโตมากเกินไป เป็นต้น และการเจ็บท้องคลอดเพียงเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงมาก ทำให้ใช้เวลาทำคลอดนานมากขึ้น

อาจจะส่งผลไม่ดีต่อทารกในครรภ์ได้และสุขภาพของแม่ก็จะเหนื่อยมากขึ้นด้วย



Q: ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเร่งคลอดมีหรือไม่ ?

A: ผลข้างเคียงของยาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การให้ยาผ่านทางน้ำเกลือ อาจจะทำให้ผลข้างเคียงเกิดน้อยมาก จึงสามารถใช้ยาเร่งคลอดเพื่อกระตุ้นการเจ็บครรภ์ให้มากขึ้นได้ และทำให้มดลูกบีบตัวออก แต่ถึงอย่างไรก็ควรใช้น้ำนี้ให้ตรงตามข้อบ่งใช้อย่างเคร่งครัด