

6

せっぱくりゅうざん せっぱくそうざん
切迫流産・切迫早産

(تهدید به سقط جنین و ولادت قبل از وقت)

せっぱくりゅうざん
切迫流産

流産になりそうですが、流産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週未満に、出血があったり、お腹が痛くなったり、などの症状がありますが、妊娠は継続できるかもしれないと判断されている状態です。

せっぱくりゅうざん
切迫流産の治療

妊娠12週までは流産に有効な薬はないといわれているので、治療は安静が原則です。

せっぱくそうざん
切迫早産

早産になりそうですが、早産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週以降に、お腹が何どもはったり、お腹がはるときに痛みがあったり、膣から出血したりなどの症状がある状態ですが、それらの症状がなくても子宮の出口が開いたり、頸管長という子宮の出口の長さが短くなって、切迫早産と診断される場合もあります。なかには、破水して早産になってしまうこともあります。つまり、「赤ちゃんが生まれるにはまだ早い時期に生まれてきそうな状態」のことをいいます。

تهديد به سقط جنين

تهديد به سقط جنين دقيقاً سقط جنين نيست. بلکه احتمال سقط جنين است. در مورد تهديد به سقط جنين، خونريزي مهبلي يا دل دردي ممکن است قبل از هفته 22 حاملگي رخ دهد، اما تخمين زده می شود که حاملگي همچنان ادامه يابد.

درمان تهديد به سقط جنين

هيچ درماني موثري براي سقط جنين تهديد شده وجود ندارد، اما استراحت و حفظ آرامش درمان عمومي است.

تهديد به ولادت قبل از وقت

تهديد به ولادت قبل از وقت زماني رخ ميدهد که ممکن ولادت قبل از وقت هم اتفاق بيفتد، اما هميشه اينطور نيست. اعراض اصلي شامل سخت شدن مکرر شکم يا تقلصات، درد هنگام سخت شدن شکم، يا خونريزي مهبلي بعد از هفته 22 حاملگي است. با اين حال، بدون اين اعراض، زماني که دهانه رحم شروع به باز شدن می کند يا زماني که طول دهانه رحم کوتاه می شود، ممکن است تهديد به ولادت قبل از وقت تشخيص داده شود. در برخی موارد، آبريزي رخ ميدهد و باعث ولادت قبل از وقت می شود. به عبارت ديگر، تهديد به ولادت قبل از وقت "شرائطي است که به نظر می رسد طفل بيرون می آيد، حتی اگر هنوز برای بيرون آمدن نوزاد زود است".

切迫早産の治療

治療は、安静入院が原則で、お腹のはりを止めるための薬を点滴します。外来では、飲み薬を使用することもあります。また、腫の感染が原因と判断されたときは、抗菌薬を使用することもあります。お腹がはっていないのに子宮の出口が開いていってしまう場合は、手術で子宮の出口をしぼることもあります。



استراحت و حفظ آرامش در شفاخانه از درمان های عمومی است و تزریق وریدی (تداوی داخل وریدی) برای کاهش تقلصات یا درد انجام می شود. در خدمات سرپایی، ممکن است برای شما بصورت منظم دوا داده شود. اگر سبب آن انتانات مهیلی باشد از شما خواسته شود که دواهای ضد باکتریایی مصرف کنید. اگر شکم سخت نشده باشد اما دهانه رحم شروع به باز شدن کند، ممکن است جراحی برای بستن دهانه رحم انجام شود.

توکن به 妊娠 34 週未滿の場合、もし赤ちゃんが生まれたら、まだ自分では十分に呼吸ができないので、入院してお腹のはりを止める薬を点滴しますが、早く生まれた小さい赤ちゃんが入院できる施設 (新生児集中治療室: Neonatal Intensive Care Unit: NICU) がある病院にうつらなければならないこともあります。

お腹のはりを止めるお薬を使用すると動悸がしたり、体が熱くなったり、手がふるえたり、などの副作用が出ることも多いのですが、だんだん症状はかかくなっていきます。

مصرف دواهایی کاهش تقلصات باعث عوارض جانبی مانند نفس تنگی، بلند رفتن غیرعادی حرارت بدن، لرزش دستها و بیقراری میشود، اما این عوارض به تدریج از بین میروند. به خصوص در حاملگی های کمتر از 34 هفته، اگر نوزاد تولد شود نمی تواند تنفس کند، بنابراین دواهای IV برای کاهش تقلصات شکم در شفاخانه شما به تزریق می شود. همچنین ممکن نوزاد بدنیا بیاید و درینصورت نوزاد باید به NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) شفاخانه منتقل و بستر شود.

