

15

つか  
しゅつさん  
かん  
よく使う出産に関する用語  
(Istilah Terkait Melahirkan  
yang Sering Digunakan)



妊婦期(外来で)

母子手帳 ほし てちょう	BOSHI-TECHOU	
妊婦健診 にんぶけんしん	NINPU-KENSHIN	
診察台 しんさつだい	SHINSAT SU-DAI	
内診 ないしん	NAISHIN	
<p>「下から検査します」などと説明される。下着(パンツ)をぬいで、診察台にあがる。ズボンのときは、一緒にぬぐ。</p>		
尿検査 ようけんさ	NYOU-KENSA	

## Masa kehamilan (dengan rawat jalan)


Buku Kesehatan Ibu dan Anak	
Pemeriksaan kesehatan ibu hamil	
Meja pemeriksaan	
Pemeriksaan panggul	
Dokter akan menjelaskan, “Saya akan periksa dari bawah.” Tanggalan pakaian dalam (celana dalam) dan naiklah ke meja pemeriksaan. Apabila mengenakan celana, tanggalan bersamaan.	
Tes urin	

血圧測定 <small>けつあつそくてい</small>	KETSUATSU-SOKUTEI	
体重測定 <small>たいじゅうそくてい</small>	TAIJYU-SOKUTEI	
血液検査 <small>けつえきけんさ</small>	KETSUEKI-KENSA	
感染症 検査 <small>かんせんじょうけんさ</small>	KANSEN SHO U-KENSA	
超音波 検査 <small>ちょうおんぱくけんさ</small>	CHOUONPA-KENSA	
「エコー検査」ともいわれる		
胎児心音 検査 <small>たいじしんおんけんさ</small>	TAIJISHINON-KENSA	
「ドップラー検査」ともいわれる		
子宮頸部 細胞診 検査 <small>しきゅうけいぶさいぼうしんけんさ</small>	SHIKYUKEIB USAIBOUSHI N-KENSA	
「スメア検査」ともいわれる		
膣分泌物 検査 <small>ちつぶつひつぶつけんさ</small>	CHITSUBUN PITSUBUTSU-KENSA	
「おりもの検査」ともいわれる		

Pengukuran tekanan darah	
Pengukuran berat badan	
Tes darah	
Tes penyakit menular	
Ultrasonografi	
Juga disebut “ekō kensa (tes echo/gema suara)”	
Tes detak jantung janin	
Juga disebut “doppurā kensa (tes Doppler)”	
Tes sitologi serviks	
Disebut juga “sumeia kensa (tes papsmear)”	
Tes sekresi vagina	
Disebut juga “orimono kensa (tes cairan vagina)”	

ノンストレ ステスト	NON- SUTORESU- TESUTO	
おなかのはりと赤ちゃんの状態を見る検査。 40~60分くらいかかる。		
分娩予約	BUNBEN YOYAKU	
出産するために予約をすること。 早い時期に必要なことが多いので、スタッフに相談しましょう。予約金を支払うこともあります。		

## 分娩期(出産のとき)

便がしたい 感じ	BEN-GA- SHITAIKANJI	
毛をそる	KE-O-SORU	
浣腸	KANCHOU	
点滴	TENTEKI	

Non-Stress Test	
Tes untuk melihat pengencangan perut dan keadaan bayi. Membutuhkan sekitar 40-60 menit.	Reservasi persalinan

Reservasi untuk melahirkan. Banyak hal yang perlu disiapkan di masa-masa awal, jadi mari konsultasikan dengan staf kesehatan. Mungkin juga perlu membayar biaya reservasi.

## Masa persalinan (ketika melahirkan)

Rasa ingin buang air besar	
Mencukur bulu	
Enema (prosedur pemasukan cairan melalui anus untuk merangsang peristaltik usus besar supaya dapat buang air besar agar bersih)	
Infus	

深呼吸 しんこきゅう	SHINKOKYU	
息をすう いきをすう	IKI-O-SUU	
息をはく いきをはく	IKI-O-HAKU	
力をぬく ちからをぬく	CHIKARA-O-NUKU	
あごをひく AGO-O-HIKU	AGO-O-HIKU	
おしりを ぶんぶんだい 分婉台に つける TSUKERU	OSHIRI-O-BUNBENDAI-NI-TSUKERU	
いきむ IKIMU	IKIMU	
足を開く ASHI-O-HIRAKU	ASHI-O-HIRAKU	
目を開ける ME-O-AKERU	ME-O-AKERU	
赤ちゃんが でるところ を切る AKACHAN-GA-DERUTOKORO-O-O-KIRU	AKACHAN-GA-DERUTOKORO-O-O-KIRU	

Napas dalam-dalam	
Tarik napas	
Buang napas	
Santai/rileks	
Tarik dagu	
Taruh pantat pada meja persalinan	
Mengejan	
Lebarkan kaki	
Buka mata	
Memotong tempat keluarnya bayi	

胎盤	TAIBAN	
出血	SHUKKETSU	
着がえる	KIGAERU	
眠る	NEMURU	
部屋に かえる	HEYA-NI- KAERU	

Plasenta	
Pendarahan	
Ganti baju	
Tidur	
Kembali ke kamar	

### さんご しゅつさん 産後(出産のあと)

くすり 薬をのむ	KUSURI-O- NOMU	
あさ 朝	ASA	
ひる 昼	HIRU	
よる 夜	YORU	
じょくじ 食事のあと	SHOKUJI- NO-ATO	

### Postpartum (setelah melahirkan)

Minum obat	
Pagi	
Siang	
Malam	
Setelah makan	

尿の回数 にょう かいすう	NYOU-NO-KAISUU	
尿がない にょう でない	NYOU-GA-DENAI	
便の回数 べん かいすう	BEN-NO-KAISUU	
便がない べん でない	BEN-GA-DENAI	
食事の量 しょくじ の りょう	SHOKUJI-NO-TABETARYO	
全部 ぜんぶ	ZENBU	
半分 はんぶん	HANBUN	
3割 さんわり	SANWARI	
たべてない tabete-inai	TABETE-INAI	
ナプキン (パット)をみせてください (PATTO)-O-MISETE-KUDASAI	NAPUKIN	
血の量 ちのりょう	CHI-NO-RYO	
多い おお	OOI	
少ない すくない	SUKUNAI	
同じ おなじ	ONAJI	

Frekuensi buang air kecil	
Urin/kencing tidak keluar	
Frekuensi buang air besar	
Feses/kotoran tidak keluar	
Jumlah makanan yang telah dimakan	
Semua	
Setengah	
30%, sepertiga	
Tidak makan	
Tolong perlihatkan pembalut (pad) Anda	
Jumlah darah	
Banyak	
Sedikit	
Sama	

下の傷を みせて ください	SHITA-NO-KIZU-O-MISETE-KUDASAI	
お腹を みせて ください	ONAKA-O-MISETE-KUDASAI	
いた 痛い	ITAI	
つよ 強い	TSUYOI	
よわ 弱い	YOWAI	
医師が診察 します	ISHI-GA-SHINSATSU-SHIMASU	
採血を します	SAIKETSU-O-SHIMASU	
おっぱいが いた 痛い	OPPAI-GA-ITAI	
おっぱいが はる	OPPAI-GA-HARU	
おっぱいが あつ 熱い	OPPAI-GA-ATSUI	

Tolong perlihatkan luka pada bagian bawah Anda	
Tolong perlihatkan perut Anda	
Sakit	
Kuat	
Lemah	
Dokter akan memeriksa	
Akan diambil darah	
Payudara terasa sakit	
Payudara membengkak	
Payudara panas	

ちくび 乳首が痛い	CHIKUBI-GA-ITAI		Puting terasa sakit	
授乳	JYUNYU		Menyusui	
横向き	YOKO-DAKI		Pegangan menggendong	
縦抱き	TATE-DAKI		Pegangan tegak	
交差抱き	KOUSA-DAKI		Pegangan menggendong silang	
脇抱き	WAKI-DAKI		Pegangan bola/pegangan ketiak	
レイドバック	REIDO-BAKKU		Berbaring	
沐浴	MOKUYOKU	 	Mandi (bak)	 

沐浴指導 もくよくしどう	MOKUYOKU-SHIDOU		Latihan/bimbingan untuk memandikan	
退院指導 たいいんしどう	TAIIN-SHIDOU		Bimbingan keluar dari rumah sakit	
面会時間 めんかいじかん	MENKAI-JIKAN		Jam berkunjung	
退院の時間 たいいんじかん	TAIIN-NO-JIKAN		Waktu untuk keluar dari rumah sakit	
シャワーを あびる	SHAWA-O-ABIRU		Mandi (shower)	
めまいが する	MEMAI-GA-SURU		Pusing	
頭が いたい	ATAMA-GA-ITAI		Kepala terasa sakit	
吐き気が ある	HAKIKE-GA-ARU		Mual	
だるい	DARUI		Letih	

あか 赤ちゃんに 関連してよく使われる表現

母乳をのまない <small>(ほにゅうをのまない)</small>	BONYU-O-NOMANAI	
ミルクをのまない <small>(ミルクをのまない)</small>	MIRUKU-O-NOMANAI	
げっぷがでない <small>(げっぷがでない)</small>	GEPPU-GA-DENAI	
すぐ泣く <small>(なぐく)</small>	SUGU-NAKU	
泣きやまない <small>(なきやまない)</small>	NAKI-YAMANAI	
だっこ <small>(だっこ)</small>	DAKKO	
ミルク <small>(ミルク)</small>	MIRUKU	

Istilah terkait bayi yang sering digunakan

Tidak ingin minum ASI	
Tidak ingin minum susu formula	
Sendawa tidak keluar	
Segera menangis	
Tidak berhenti menangis	
Gendong	
Susu formula	

おむつ	OMUTSU		Popok	
あか 赤ちゃん のきがえ	AKACHAN-NO- KIGAE		Baju ganti bayi	
すこ 少しの 間あず かってほ しい	SUKOSHI-NO- AIDA- AZUKATTE- HOSHII		Minta jaga sebentar	
てつだ 手伝って ほしい	TETSUDATTE- HOSHI		Minta bantu	
わからな い	WAKARANAI		Tidak mengerti	
新生児室	SHINSEIJI- SHITSU		Ruang bayi baru lahir	
たいじゅう 体重 測定	TAIJYU- SOKUTEI		Pengukuran berat badan	
あか 赤ちゃん の検査	AKACHAN-NO- KENSA		Pemeriksaan bayi	