

6

せっぱくりゅうざん せっぱくそうざん

切迫流産・切迫早産

(ການລູລູກຫຼືເກີດກ່ອນກຳນົດ)



せっぱくりゅうざん 切迫流産

流産になりそうですが、流産にはなってはいない状態のことをいいます。妊娠22週未満に、出血があったり、お腹が痛くなったり、などの症状がありますが、妊娠は継続できるかもしれないと判断されている状態です。

せっぱくりゅうざん 切迫流産の治療

妊娠12週までは流産に有効な薬はないといわれているので、治療は安静が原則です。

せっぱくそうざん 切迫早産

早産になりそうですが、早産にはなってはいない状態のことをいいます。妊娠22週以降に、お腹が何度もはったり、お腹がはるときに痛みがあったり、膣から出血したりなどの症状がある状態ですが、それらの症状がなくても子宮の出口が開いたり、頸管長という子宮の出口の長さが短くなって、切迫早産と診断される場合もあります。なかには、破水して早産になってしまうこともあります。つまり、「赤ちゃんが生まれるにはまだ早い時期に生まれてきそうな状態」のことをいいます。

せっぱくそうざん 切迫早産の治療

治療は、安静入院が原則で、お腹のはりを止めるための薬を点滴します。外来では、飲み薬を使用することもあります。また、膣の感染が原因と判断されたときは、抗菌薬を使用することもあります。お腹がはっていないのに子宮の出口が開いていってしまう場合は、手術で子宮の出口をしぼることもあります。

ການລູລູກ

ການລູລູກອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເປັນສະຖານະການທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ທີ່ຫາກໍ່ຖືພາໄດ້ບໍ່ດົນ ຖືພາໄດ້ນ້ອຍກວ່າ 22ອາທິດ ມີເລືອດອອກ ແລະ ມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ອາດຈະສາມາດຕັ້ງທ້ອງຕໍ່ໄປໄດ້ ຂຶ້ນກັບການກວດບິ່ງມະຕິຕ່າງໆ ຈາກແພດໝໍນຳອີກ.

ການຮັກສາການລູລູກ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເລີ່ມຕັ້ງທ້ອງຮອດ 12ອາທິດ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລູລູກຫຼາຍ ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ເກີດການລູລູກນັ້ນ ວິທີດຽວທີ່ເປັນຫຼັກຄື: ແມ່ມານຕ້ອງພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງເລີຍໃນຊ່ວງນີ້ແຮງດີ.

ການເກີດກ່ອນກຳນົດ

ການເກີດກ່ອນກຳນົດ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເປັນສະຖານະການທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນກັນ. ຫຼັງຕັ້ງທ້ອງໄດ້ 12ອາທິດຂຶ້ນໄປຖ້າມີອາການຕຶງທ້ອງ ເຄັ່ງທ້ອງຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ເຈັບທ້ອງ ແນ່ນທ້ອງ ແລະ ມີເລືອດອອກທາງປາກມິດລູກເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ປາກມິດລູກຍັງເປີດອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຍາວຂອງປາກມິດລູກຈະສັ້ນລົງ ຫາກມີອາການດັ່ງກ່າວ ໝໍ້ຈະບິ່ງມະຕິວ່າ ມີເປີເຊັນສູງທີ່ຈະເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າຖືງນ້ຳຄາວປາແຕກຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ເກີດລູກອອກມາກ່ອນກຳນົດແນ່ນອນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: “ສະຖານະການທີ່ເດັກເກີດອອກມາໄວກວ່າປົກກະຕິ” ກໍ່ເປັນໄດ້

ການຮັກສາການເກີດກ່ອນກຳນົດ

ໂດຍຫຼັກການທົ່ວໄປ ຈະໃຫ້ຢາທາງນ້ຳສະໂລມເພື່ອຢຸດອາການທ້ອງເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ໃຫ້ຢາກິນ ແລະ ຖ້າພົບສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອທາງປາກມິດລູກກໍ່ຄວນກິນຢາຂ້າເຊື້ອຜ່ອມນຳ. ກໍລະນີບໍ່ມີອາການເຄັ່ງທ້ອງແຕ່ມິດລູກຍັງເປີດອອກ ຈະໄດ້ໃຊ້ວິທີຜູ້ຕັດຫຍິບປາກມິດລູກ



お腹のはりを止めるお薬を使用すると動悸がしたり、体が熱くなったり、手がふるえたり、などの副作用が出ることも多いのですが、だんだん症状はかくなるっていきます。

とくに妊娠34週未満の場合、もし赤ちゃんが生まれたら、まだ自分では十分に呼吸ができないので、入院してお腹のはりを止める薬を点滴しますが、早く生まれた小さい赤ちゃんが入院できる施設(新生児集中治療室: Neonatal Intensive Care Unit: NICU)がある病院にうつらなければならないこともあります。

ຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຢາແກ້ທ້ອງເຄັ່ງທີ່ພົບຫຼາຍ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຮ່າງກາຍມີໄຂ້ສູງ ມີສິ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ກໍລະນີເດັກເກີດອອກມາໃນຊ່ວງອາຍຸຖືພານ້ອຍກວ່າ 34ອາທິດ ເດັກຈະບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ ແມ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມອນໂຮງໝໍເພື່ອໃຫ້ຢາແກ້ອາການທ້ອງເຄັ່ງທາງນໍ້າສະໂລມ. ສ່ວນເດັກການຂະຫຍາຍໂຕຍັງບໍ່ສົມບູນ ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດກ່ອນກໍານົດນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ນອນຮັກສາຢູ່ຫ້ອງ “ຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍວິກິດເກີດໃໝ່(Shinseiji syoucyouchiryoushitsu: Neonatal Intensive Care Unit (NICU))” ທີ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ.

