

7

ぐんようけつせい れん さ きゅうきん
B群溶血性レンサ球菌
 (ເຊື້ອສະເຕບໂຕຄອດຄັສກູບບີ (GBS))



B群溶血性レンサ球菌(GBS)は、ふつうは問題にならない腔の中にある細菌(常在菌)のひとつです。

妊娠していないときは問題にはなりません、妊娠中にママの腔になかに GBS がいることがわかる(陽性)と治療が必要です。それは、赤ちゃんが腔を通過して生まれてくるので、出産のときに赤ちゃんにうつってしまうことがあるからです。GBS にうつってしまうと赤ちゃんの状態がとても悪くなってしまうことがあります。

GBS がいても妊娠中は赤ちゃんにうつりませんが、出産のときにうつる可能性がある、陣痛がきたときや破水をしたときは、赤ちゃんを GBS から守るための準備として、ママが抗生物質の点滴をうけます。

Q: どの検査をするの?

A: 腔のなかの細菌の検査です。時期は、妊娠33~37週ごろの出産に近い時期にあります。

Q: どの治療をするの?

A: GBS が陽性といわれたら、出産についての説明があります。治療は、陣痛がはじまったときや破水をしたときに、入院してペニシリン系の抗生物質の点滴を数時間ごとに行います。

Q: もし赤ちゃんが感染したらどうなるの?

A: 赤ちゃんは肺炎、髄膜炎などの重症な状態になり、亡くなってしまうことがあります。生まれた赤ちゃんにすぐに抗生物質の点滴をして治療する方法もありますが、出産のときにママが抗生物質の点滴をうけるほうが効果的といわれています。

ເຊື້ອສະເຕບໂຕຄອດຄັສກູບບີ(GBS)ຄື: ແມ່ນເຊື້ອແບັດທິເລຍຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ປະຕິໃນມິດລູກ (ແບັດທິເລຍປະຈຳຖິ່ນ) ກໍລະນີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກພົບ ຈະບໍ່ເກີດໂທດໃດໆທັງນັ້ນ ແຕ່ເມື່ອແມ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຖືພາຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຊີວິດມາທັນທີ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຮີບຮັກສາ ເພາະວ່າເດັກທີ່ເກີດຜ່ານທາງປາກມິດລູກ ຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອແບັດທິເລຍGBS ໄດ້ ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ເກີດຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່.

ສ່ວນເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອແບັດທິເລຍ GBS ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ເມື່ອແມ່ມີອາການເຈັບທ້ອງເກີດ ຫຼື ຖືງນ້ຳຄາວປາແຕກ ກໍຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອຫຼັງເກີດໄດ້ ຫຼື ຂະນະກຳລັງເກີດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນເດັກເກີດໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້ ແມ່ຄວນໄດ້ຮັບຢາຂ້າເຊື້ອແບັດທິເລຍນີ້ທາງນ້ຳສະໂລມຜ່ອມ.

Q: ກວດພົບໄດ້ແນວໃດ?

A: ສາມາດກວດພົບເຊື້ອແບັດທິເລຍໃນມິດລູກນີ້ໄດ້ ໂດຍຈະພົບໃນຊ່ວງອາຍຸຖືພາຕັ້ງແຕ່ 33 - 37ອາທິດ ຫຼື ຊ່ວງໄກ້ໄລຍະຈະເກີດ.

Q: ຮັກສາໂຮກໄດ້ແນວໃດ?

A: ເຊື້ອແບັດທິເລຍ GBS ເປັນເຊື້ອສວຍໂອກາດ ເວລາເຈັບທ້ອງໃກ້ຈະເກີດ ຫຼື ຖືງນ້ຳຄາວປາແຕກ.

ການຮັກສາແມ່ນຕ້ອງໄປນອນໂຮງໝໍເພື່ອຮັບຢາຂ້າເຊື້ອ (penicillin) ໂດຍການໃຫ້ນ້ຳສະໂລມເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ .

Q: ຖ້າເດັກເກີດໃໝ່ຕິດເຊື້ອຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

A: ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຈະມີອາການປ່ວຍເປັນໂຮກປອດອັກເສບ ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ແລະ ສຸດທ້າຍອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້. ເດັກແລກເກີດເມື່ອເກີດອອກມາແລ້ວ ຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອຜ່ານທາງນ້ຳສະໂລມ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາເກີດລູກຄວນໃຫ້ຢາຂ້າເຊື້ອທາງນ້ຳສະໂລມໃຫ້ແມ່ຜ່ອມ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາໂຮກນີ້ຢັ້ງຊື່ນ.