

6

せっぱくりゆうざん せっぱくそうざん

切迫流産・切迫早産

(သားပျက်သားလျော့.စောမွေးခြင်းအန္တရာယ်)



せっぱくりゆうざん 切迫流産

流産になりそうですが、流産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週未満に、出血があったり、お腹が痛くなったり、などの症状がありますが、妊娠は継続できるかもしれないと判断されている状態です。

せっぱくりゆうざん 切迫流産の治療

妊娠12週までは流産に有効な薬はないといわれているので、治療は安静が原則です。

せっぱくそうざん 切迫早産

早産になりそうですが、早産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週以降に、お腹が何度もはったり、お腹がはるときに痛みがあったり、膣から出血したりなどの症状がある状態ですが、それらの症状がなくても子宮の出口が開いたり、頸管長という子宮の出口の長さが短くなって、切迫早産と診断される場合もあります。なかには、破水して早産になってしまうこともあります。つまり、「赤ちゃんが生まれるにはまだ早い時期に生まれてきそうな状態」のことをいいます。

せっぱくそうざん 切迫早産の治療

治療は、安静入院が原則で、お腹のはりを止めるための薬を点滴します。外来では、飲み薬を使用することもあります。また、膣の感染が原因と判断されたときは、抗菌薬を使用することもあります。お腹がはっていないのに子宮の出口が開いていってしまう場合は、手術で子宮の出口をしぼることもあります。

သားပျက်သားလျော့အန္တရာယ်

ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ချေရှိနေသောအခြေအနေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ဝန် ၂ ပတ်မတိုင်မီသွေးစီးထွက်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း စသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းကိုယ်ဝန်ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်သောအခြေနေဟုယူဆနိုင်ပါသည်။

သားပျက်သားလျော့အန္တရာယ်အတွက်ဆေးကုသမှု

ကိုယ်ဝန်နှစ်ပတ်အထိကျအန္တရာယ်တွင်ပြည့်စုံသောကုသမှုမရှိသေးသောကြောင့် အနားယူ၍ တည်ငြိမ်စွာနေခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

စောမွေးခြင်းအန္တရာယ်

ကလေးစောမွေးနိုင်ချေရှိသောအခြေနေဖြစ်သည်။ကိုယ်ဝန် ၂ ပတ်ကျော်၌ဝမ်းဗိုက်ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတင်းကျပ်၍နာကျင်ခြင်းနှင့်မိန်းမအင်္ဂါမှသွေးထွက်ခြင်းတို့အပြင်မွေးလမ်းကြောင်းပွင့်လာခြင်း၊သားအိမ်လမ်းကြောင်းကျဉ်းလာပြီးကလေးစောမွေးနိုင်ချေရှိသည့်အခြေအနေတို့ဖြစ်ပါသည်။အတွင်းတွင်ရေမွှာပေါက်နေတတ်သည်များလည်းရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် (ကလေးကမွေးချိန်မတိုင်ဘဲအချိန်စောစွာမွေးလာသည့်အခြေအနေ)ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။

ကလေးစောမွေးခြင်း၏ဆေးကုသမှု

ဆေးရုံ၌တည်ငြိမ်စွာအနားယူကုသခံခြင်းသည်ယေဘုယျဖြစ်ပြီးဝမ်းဗိုက်နာခြင်းပျောက်ကင်းစေသောဆေးထိုးပါသည်။အခြားအနေနှင့်သောက်ဆေးပေးခြင်းများလည်းရှိသည်။သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင်ကူးစက်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကပိုးသတ်ပျောက်ဆေးအသုံးပြုမှုလည်းရှိသည်။ဝမ်းဗိုက်ကတင်းကျပ်မှုမရှိဘဲမွေးလမ်းကြောင်းပွင့်သွားလျှင်ခွဲစိတ်၍မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။



お腹のはりを止めるお薬を使用すると動悸がしたり、体が熱くなったり、手がふるえたり、などの副作用が出ることも多いのですが、だんだん症状はかるくなっていきます。

ဝမ်းဗိုက်နာပျောက်ဆေးအသုံးပြုမှုကြောင့်မောပန်းခြင်းကိုယ်အပူချိန်တက်လာခြင်း၊လက်တုန်ခြင်းစသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းလက္ခဏာများသည်တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။

とくに妊娠34週未満の場合、もし赤ちゃんが生まれたら、まだ自分では十分に呼吸ができないので、入院してお腹のはりを止める薬を点滴しますが、早く生まれた小さい赤ちゃんが入院できる施設（新生児集中治療室: Neonatal Intensive Care Unit: NICU）がある病院にうつらなければならないこともあります。

အကယ်၍ကိုယ်ဝန် ၃၄ ပတ်မပြည့်မီ မီးဖွားလာပါကကလေးသည်ချက်ချင်းကိုယ်တိုင်အသက်မရှုနိုင်သေးပါ။သင့်အားဆေးရုံမှဝမ်းဗိုက်နာပျောက်ဆေးထိုးပေးပါသည်။သို့သော်စောမွေးလာသောကလေးလေးကတက်ရောက်နိုင်သောနေရာ(မွေးကင်းစကလေးပြုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့: NICU)ရှိသောဆေးရုံသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်များလည်းရှိသည်။

