



日本では母乳をすすめる病院が多いです。また、母乳で育てたいか、ミルクをどのように使いたいかの希望を妊娠中から助産師に話しておくとよいでしょう。

日本では出産のあと入院期間(約1週間)に母乳をあげる練習をして退院します。病院では母子同室制(赤ちゃんと一緒にすごす)と母子異室制(赤ちゃんは新生児室ですごす)の両方があり、それによって授乳の時間や回数に違いがあります。

母乳について

出産のあとママの母乳はすぐには出ません。赤ちゃんにすわれることによって、出産後3日めごろから少しづつでてくるのであせらずに。最初に出る母乳は初乳といい、**黄色くドロッとしていて、免疫がふくまれています。**たくさんはでないものですが、少しでも赤ちゃんにのませられるとよいでしょう。

通常、生まれて2~3日めの赤ちゃんはママのおなかの中でもらったエネルギーと初乳だけで十分です。

また、赤ちゃんは授乳後すぐにのみたくなったり、3時間ぐらいうつり眠っていたりリズムがバラバラです。**授乳しようとしても、赤ちゃんがねむっていて、のまなかつたりします。**赤ちゃんのタイミングにあわせて授乳すると、1日10回くらい(8~12回くらい)になることもあります。

産後3~4日めになると、おっぱい(乳房)全体が熱くなり、かたくなります。これは母乳がたくさんつくられているということです。また母乳の色も変わります。産後3~4日後になると、赤ちゃんも母乳をのむことになれてくるので、少しずつ**体重がふえはじめてきます。**ママや赤ちゃんの健康状態によっては、直接母乳をあげられないこともあります。そのような場合は搾乳する(母乳を手でしづら)こともできるので、助産師に相談しましょう。

また、ミルクで育てるママは、入院中にミルクのつくり方などの説明をうけることになります。

日本では母乳をすすめる病院が多いです。また、母乳で育てたいか、ミルクをどのように使いたいかの希望を妊娠中から助産師に話しておくとよいでしょう。

日本では出産のあと入院期間(約1週間)に母乳をあげる練習をして退院します。病院では母子同室制(赤ちゃんと一緒にすごす)と母子異室制(赤ちゃんは新生児室ですごす)の両方があり、それによって授乳の時間や回数に違いがあります。

アマako ドウトコ バレマ

赤ちゃんは授乳後すぐにのみたくなったり、3時間ぐらいうつり眠っていたりリズムがバラバラです。**授乳しようとしても、赤ちゃんがねむっていて、のまなかつたりします。**赤ちゃんのタイミングにあわせて授乳すると、1日10回くらい(8~12回くらい)になることもあります。

産後3~4日めになると、おっぱい(乳房)全体が熱くなり、かたくなります。これは母乳がたくさんつくられているということです。また母乳の色も変わります。産後3~4日後になると、赤ちゃんも母乳をのむことになれてくるので、少しずつ**体重がふえはじめてきます。**ママや赤ちゃんの健康状態によっては、直接母乳をあげられないこともあります。そのような場合は搾乳する(母乳を手でしづら)こともできるので、助産師に相談しましょう。

また、ミルクで育てるママは、入院中にミルクのつくり方などの説明をうけることになります。

赤ちゃんは授乳後すぐにのみたくなったり、3時間ぐらいうつり眠っていたりリズムがバラバラです。**授乳しようとしても、赤ちゃんがねむっていて、のまなかつたりします。**赤ちゃんのタイミングにあわせて授乳すると、1日10回くらい(8~12回くらい)になることもあります。

産後3~4日めになると、おっぱい(乳房)全体が熱くなり、かたくなります。これは母乳がたくさんつくられているということです。また母乳の色も変わります。産後3~4日後になると、赤ちゃんも母乳をのむことになれてくるので、少しずつ**体重がふえはじめてきます。**ママや赤ちゃんの健康状態によっては、直接母乳をあげられないこともあります。そのような場合は搾乳する(母乳を手でしづら)こともできるので、助産師に相談しましょう。

また、ミルクで育てるママは、入院中にミルクのつくり方などの説明をうけることになります。


赤ちゃんは授乳後すぐにのみたくなったり、3時間ぐらいうつり眠っていたりリズムがバラバラです。**授乳しようとしても、赤ちゃんがねむっていて、のまなかつたりします。**赤ちゃんのタイミングにあわせて授乳すると、1日10回くらい(8~12回くらい)になることもあります。

産後3~4日めになると、おっぱい(乳房)全体が熱くなり、かたくなります。これは母乳がたくさんつくられているということです。また母乳の色も変わります。産後3~4日後になると、赤ちゃんも母乳をのむことになれてくるので、少しずつ**体重がふえはじめてきます。**ママや赤ちゃんの健康状態によっては、直接母乳をあげられないこともあります。そのような場合は搾乳する(母乳を手でしづら)こともできるので、助産師に相談しましょう。

また、ミルクで育てるママは、入院中にミルクのつくり方などの説明をうけることになります。

おっぱいのくわえさせ方

乳首の下に赤ちゃんの下のくちびるをあて固定させて、
乳首だけでなく、乳輪(乳首の色のついている場所)
全体を赤ちゃんの口にいれるつもりで、くわえさせます。
赤ちゃんの口をママのゆびでトントンとさわると、赤ちゃん
が口を大きくあけることがあります。そのタイミング
でくわえさせるのもよいでしょう。



こんなときは電話で相談しましょう

- おっぱい(乳房)がはって痛い、しこりがあるとき
- 熱があるとき(からだがふるえると 40°C 近い熱がで出ることがあります)
- 乳首が痛いとき
- 乳首から血が出るとき
- 赤ちゃんの便や尿の回数や量がへって、のんでもすぐ泣くとき
- その他、おっぱいのことであよたったとき

しかし、赤ちゃんが泣くのはおなかがすいたときだけではないので、眠い、暑い、だっこしてほしいなど、いろいろことを泣いてつたえようとしています。いつも赤ちゃんの様子をよく見ておくことが大切です。

何か授乳のことできつたことがあるとき、1ヶ月健診までは出産した病院で対応してくれることが多いです。そのほかに、母乳外来のある病院や助産院(助産師が開業している)を利用することもできます。自宅や実家の近くの母乳外来などをしらべておくとよいでしょう。

स्तनपान गराउने तरिक

स्तनपान गराउदा, स्तनको मुन्टो बच्चाको तल्लो ओठमा अडेस राखेर, स्तनको खेरो भाग समेत बच्चाको मुख भित्र पस्ने गरी स्तन राखिनु पर्दछ। बच्चाको मुखमा आमाले औलाले छोयो भने, बच्चाले मुख ठुलो पार्छ । त्यति बेला स्तनपान गराउदा पनि राम्रो हुन्छ।



यस्तो अवस्थामा फोनबाट सल्लाह लिने गर्ने

- स्तन सुनिएर दुखेको छ र गांठो छ
- ज्वरो आएको छ (शरीर काँपेकोको छ भने, 40°C डिग्री नजिक ज्वरो आएको हुन सक्छ)
- स्तनको मुन्टो (निप्पल) दुखेको छ
- स्तनको मुन्टो (निप्पल) बाट रगत आएको छ
- बच्चाको दिशा र पिसब गर्न संख्या घटेको छ र दुध खाए पनि तुरुन्तै रुन्छ
- त्यस्तै स्तनको बारेमा थाह नभएको कुरा भाइमा तर बच्चाहरू भोकाएको बेलामा मात्र रुदैनन्, निद्रा लागेमा, गर्मी भएमा, अंगालो हालोस भन्न चाहेमा पनि रुन्छन। त्यसैले बच्चाको अवस्थाको धेरै ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। स्तनपान गराउनमा कुनै समस्या भयो भने, सुत्केरी गराएको अस्पतालले एक महिनासम्म हेरिदिन्छ। त्यस्तै, तपाईं स्तनबारे हेर्ने अस्पताल वा दक्ष सुँडेनी क्लीनिकमा पनि जान सक्नु हुनेछ। तपाईंको घर वा बस्ने ठाऊ नजिकको स्तन बारे हेर्ने अस्पताल / क्लीनिकको बारे खोजेर राख्न भयो भने राम्रो हुन्छ।