

5

にんしんとうにようびょう 妊娠糖尿病 (ගර්භණී දියවැඩියාව)



妊娠中に血糖値がたかくなって、糖尿病にちかい状態と判断されたとき、妊娠糖尿病(GDM)と診断されます。ママの体は、赤ちゃんに糖を送ろうとしすぎて、血糖が高い状態になってしまいます。そのため、妊娠中に血糖をコントロールしないと赤ちゃんが大きくなりすぎたり、また、赤ちゃんが生まれるとすぐに血糖が低くなって、発作をおこしたりします。

もともと糖尿病ではなかった人が、妊娠して血糖値が基準値をこえた場合と、妊娠24週ごろのスクリーニング検査で異常値をしめして、75gOGTT という検査でも血糖値が基準値をこえた場合に、GDM と診断されます。75gOGTT の方法は、朝から何もたべずに病院にいき、ブドウ糖をのんで検査をします。のむ前、のんで1時間後、2時間後と、3回採血をされます。

ගර්භණී සමයේදී රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ යන විට ගර්භණී දියවැඩියාව (GDM) ලෙස රෝග විනිශ්චය කරනු ලැබේ. මවගේ ශරීරය දරුවාට සීනි යැවීමට දැඩි උත්සාහයක් ගන්නා අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ යයි. එබැවින් ගර්භණී සමයේදී රුධිරයේ සීනි පාලනය නොකළහොත් දරුවා විශාල විය හැකි අතර, දරුවා ඉපදුණු වහාම රුධිරයේ සීනි අඩු වී හදිසි කම්පන තත්වයන්ද ඇතිවිය හැකිය.

මුලින් දියවැඩියා රෝගියෙකු නොවූ අයෙකු ගැබ්ගෙන රුධිරයේ සීනි මට්ටම සම්මත අගය ඉක්මවා ගියහොත්, 24 වැනි සතියේදී සිදුකරන පරීක්ෂණයේදී අසාමාන්‍ය අගයක් පෙන්නුම් කර , 75g OGTT පරීක්ෂණයේදී රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරයි නම් එය ගර්භණී දියවැඩියාව ලෙස හඳුනා ගනු ලබයි. 75g OGTT පරීක්ෂණය යනු උදේට කිසිදු ආහාරයක් නොගෙන රෝහලට ගොස් මිදි යුෂ පානය කර සිදුකර පරීක්ෂණය වේ. මිදි යුෂ පානය කිරීමට පෙර, පානය කිරීමෙන් පැය 1 කට පසුව සහ පානය කිරීමෙන් පැය 2 කට පසුව රුධිරය 3 වතා වක් ගෙන පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබයි.

からだ なか なに
Q: 体の中で何がおこるの？

A: 妊娠糖尿病 は自分で感じる症状 があまりありません。しかし、ママの血糖がたかくなると赤ちゃんも血糖がたかくなり、いろいろな悪い影響 が出ます。

●ママへの影響：妊娠高血圧症候群（HDP）、羊水がふえることにともなう切迫早産、産後の糖尿病 など

●赤ちゃんへの影響：流産、先天奇形、巨大児、心臓への悪影響、生まれたあとの低血糖、黄疸、死亡など

ちりょう
Q:どんな治療をするの？

A: 妊娠期間にんしんきかんを通してとおして、血糖けつとうが高たかくならないようにします。
はじめは、食事しょくじを 4〜6回かいにわけてたべるようにします
が、それでも血糖けつとうがたかい場合は、注射ちゅうしゃでインスリンを
使用しようします。とくに妊娠後半期にんしんこうはんきは、体重たいじゆうが 1週間しゅうかんで
300g以上いじょうふえないようにしましょう。多くの場合おお、出産ばあい
あとにママの血糖けつとうは正常せいじょうにもどりますが、将来的しやうらいぎに
糖尿病とうにょうびょう になりやすかったり、そのまま糖 尿 病とうにょうびょう になって
しまったりすることもあります。

Q:ගරීරය තුළ සිදු වන්නේ කුමක්ද? ?

A: ගර්භණී දියවැඩියාව ඔබටම දැනෙන රෝග ලක්ෂණ බොහොමයක් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, මවගේ රුධිරයේ සීනි වැඩි වූවහොත්, දරුවා ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ද ඉහළ ගොස් විවිධ අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි.

● මව්ව සිදුවන බලපෑම්: ගර්භණී අධි රුධිර පීඩනය, ඇමිනියොටික් තරලය වැඩි වීම හා සම්බන්ධ හදිසි හා නොමේරු දරු උපන්, පශ්චාත් ප්‍රසව දියවැඩියා ව ආදිය.

●දුරුවාට සිදුවන බලපෑම්: ගබ්සා වීම, සංජා නතිය විකෘති වීම, යෝධ දරුවන්, හෘද වස්තුවට හානි, පශ්චාත් ප්‍රසව හයිපොග්ලිසීමියා,සංගමා ලය, මරණය, ආදිය.

Q: කළ හැකි ප්‍රතිකාර මොනවාද?

A: ඔබේ ගර්භනී කාලය පුරාම ඔබේ රුධිරයේ සීනි වැඩිවීම වළක්වා ගන්න. මුලදී , ඔබේ ආහාර වේලේ 4 සිට 6 කට බෙදා ආහාරයට ගන්න. නමුත් ඔබේ රුධිරයේ සීනි තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතී නම්, ඉන්සියුලින් එන්නත් කිරීම සිදු කරන්න. විශේෂයෙන් ගැබ්ගැනීමේ දෙවන භාගයේදී, සතියක් තුළ බර ග්‍රෑම් 300 ට වඩා වැඩි නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න. බොහෝ අවස්ථා වලදී දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු මවගේ රුධිරයේ සීනි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වන නමුත් අනාගතයේදී ඇයට දියවැඩියාව වැළඳීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.