

6

切迫流早産

(ගබ්සාව සහ නොමේරූ දරු උපන්)



切迫流産

流産になりそうですが、流産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週未満に、出血があったり、お腹が痛くなったり、などの症状がありますが、妊娠は継続できるかもしれないと判断されている状態です。

切迫流産の治療

妊娠12週までは流産に有効な薬はないといわれているので、治療は安静が原則です。

切迫早産

早産になりそうですが、早産にはなっていない状態のことをいいます。妊娠22週以降に、お腹が何度もはったり、お腹がはるときに痛みがあったり、膣から出血したりなどの症状がある状態ですが、それらの症状がなくても子宮の出口が開いたり、頸管長という子宮の出口の長さが短くなって、切迫早産と診断される場合もあります。なかには、破水して早産になってしまうこともあります。つまり、「赤ちゃんが生まれるにはまだ早い時期に生まれてきそうな状態」のことをいいます。

切迫早産の治療

治療は、安静入院が原則で、お腹のはりを止めるための薬を点滴します。外来では、飲み薬を使用することもあります。また、膣の感染が原因と判断されたときは、抗菌薬を使用することもあります。お腹がはっていないのに子宮の出口が開いていってしまう場合は、手術で子宮の出口をしぼることもあります。

ආසන්න ගබ්සාව

ගබ්සාවක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති නමුත් සිදු නොවූ තත්වයකි. ඔබ ගර්භනී සති 22 ට අඩු නම් සහ ලේ ගැලීම හෝ බඩේ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ නිබෙන මුත් ගර්භනී බව දිගටම පවතිනු ලබන තත්වයකි.

ආසන්න ගබ්සාවකට ප්‍රතිකාර කිරීම

ගර්භනී භාවයේ 12 වන සතිය දක්වා ගබ්සා වීම වැළැක්වීමට එලදාසී ඖෂධ නොමැති බව කියනු ලැබේ. එබැවින් විවේකය ඉතා වැදගත් වේ.

හදිසි නොමේරූ ළදරු උපන්

මෙය ළදරුවෙකු නොමේරූ ලෙස උපත ලැබීමට ඉඩ ඇති නමුත් එය සිදු නොවන තත්වයකි. ගැබ්ගෙන 22 වැනි සතියෙන් පසු උදරය කිහිප වතාවක් ඉදිමීම, උදරය ඉදිමුණු වට වේදනාවක් හෝ යෝනි මාර්ගයෙන් රුදිරය පිටවීම වැනි රෝග ලක්ෂණ, ගර්භාෂය විවෘත වීම, ගර්භාෂය විවෘත වන ගැබ්ගෙලෙහි දිග අඩු වීම, යන ලක්ෂණ ආසන්න නොමේරූ දරු උපන් හඳුනා ගැනීමේ ලක්ෂණ වේ. සමහර අවස්ථා වලදී වෝටර් බ්‍රේක්වී දරුවා නොමේරූ ළදරුවෙකු ලෙස උපත ලබයි. වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත්, «ඉතා ඉක්මනින් උපත ලැබීමට ඉඩ ඇති තත්වයක්» යන්නෙන් අදහස් කෙරේ.

ආසන්න නොමේරූ දරු උපන් සදහා ප්‍රතිකාර

විවේකය සදහා රෝහල් ගතවී, ජේලීන් දීම සිදුකරයි. බාහිර රෝගී සායන වලදී, බොන බෙහෙත් දෙනු ලබයි. ඊට අමතරව, හේතුව යෝනි මාර්ගයේ ආසාදනයක් බව තීරණය කළහොත් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දෙනු ලබයි. උදරය වර්ධනය නොවුණත් ගර්භාෂය විවෘතව පවතිනම් ගලායාමයකින් ගර්භාෂයේ විවෘතව ඇති කොටස ගැට ගසනු ලැබේ.



お腹のはりを止めるお薬を使用すると動悸がしたり、体が熱くなったり、手がふるえたり、などの副作用が出ることも多いのですが、だんだん症状はかるくなっていきます。

とくに妊娠34週未満の場合、もし赤ちゃんが生まれたら、まだ自分では十分に呼吸ができないので、入院してお腹のはりを止める薬を点滴しますが、早く生まれた小さい赤ちゃんが入院できる施設（新生児集中治療室: Neonatal Intensive Care Unit: NICU）がある病院にうつらなければならないこともあります。

උදරයේ ඉදිමුම නැවැත්වීමට ඔහුගේ ලබා ගන්නා විට, ඔබගේ හෘද ස්පන්දනය ඉහල යෑම, ශරීරය උණුසුම් වීම හෝ අත් වෙවුලීම වැනි අතුරු ආබාධ ඇතිවේ, නමුත් රෝග ලක්ෂණ ක්‍රමයෙන් මෘදු වේ.

විශේෂයෙන් ඔබ ගැබ්ගෙන සති 34ට අඩු කාලයකින් දරුවා ඉපදුන හොත්, දරුවාට තනිවම හුස්ම ගැනීමට අපහසු නිසා රෝහල් ගත කර ප්‍රතිකාර ලබා දීම සිදුකරයි. නමුත් එහිදී රෝහල තුළ හදිසි ලදරු ඒකකයක් (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) තිබිය යුතු අතර එසේ නොතිබුනොත් හදිසි ලදරු ඒකකයක් තිබෙන රෝහලකට මාරු කරනු ලැබේ.

