

# 7

## B群(ぐん)溶(よう)血性(けつせい)レンサ球菌(きゅうきん)(GBS)

### B කාණ්ඩයේ Hemolytic Streptococcus (GBS)



B群溶血性レンサ球菌(GBS)は、ふつうは問題にならない腔の中にある細菌(常在菌)のひとつです。

妊娠していないときは問題にはなりません、妊娠中にママの腔になかに GBS がいることがわかる(陽性)と治療が必要です。それは、赤ちゃんが腔を通過して生まれてくるので、出産のときに赤ちゃんにうつってしまうことがあるからです。GBS にうつってしまうと赤ちゃんの状態がとても悪くなってしまうことがあります。

GBS がいても妊娠中は赤ちゃんにうつりませんが、出産のときにうつる可能性があるため、陣痛がきたときや破水をしたときは、赤ちゃんを GBS から守るための準備として、ママが抗生物質の点滴をうけます。

#### Q:どんな検査をするの?

A: 腔のなかの細菌の検査です。時期は、妊娠33~37週ごろの出産に近い時期にあります。

#### Q:どんな治療をするの?

A: GBS が陽性といわれたら、出産についての説明があります。治療は、陣痛がはじまったときや破水をしたときに、入院してペニシリン系の抗生物質の点滴を数時間ごとにうけます。

#### Q:もし赤ちゃんが感染したらどうなるの?

A: 赤ちゃんは肺炎、髄膜炎などの重症な状態になり、亡くなってしまうことがあります。生まれた赤ちゃんにすぐに抗生物質の点滴をして治療する方法もありますが、出産のときにママが抗生物質の点滴をうけるほうが効果的といわれています。

B කාණ්ඩයේ hemolytic streptococci (GBS) යනු යෝනි මාර්ගයේ සිටින බැක්ටීරියා විශේෂයක් වේ. ඔබ ගැබ්ගෙන නොමැති විට මෙම බැක්ටීරියාව යෝනි මාර්ගයේ සිටීම ගැටළුවක් නොවේ. නමුත් ගර්භණී සමයේදී GBS මවගේ යෝනි මාර්ගයේ ඇති විට ප්‍රතිකාර කිරීම අවශ්‍ය වේ. මක්නිසාද යත්, දරුවන් යෝනි මාර්ගය හරහා උපත ලබන බවින්, දරු ප්‍රසූතියේදී වෛරසය ආසාදනය විය හැක. ඔබට GBS වැළඳුණ නොහොත්, දරුවාගේ තත්වය ඉතා නරක අතට පත්විය විය හැක.

ගර්භණී සමයේදී ඔබට GBS නිබුණත් එය දරුවාට ආසාදනය නොවේ. නමුත් දරුවා බිහිකරන විට එය දරුවාට සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි බවින් ප්‍රසව වේදනාව ඇතිවූ විට හෝ වෝටර් බ්‍රේක් වූ විට GBS වලින් දරුවා ආරක්ෂා කර ගැනීමට මවට ප්‍රතිජීවක එන්නත් කිරීම සිදුවේ.

#### Q: සිදුකරන පරීක්ෂණය

A: එය යෝනි මාර්ගයේ බැක්ටීරියා සඳහා පරීක්ෂණයකි. ගැබ් ගෙන 33 සිට 37 වන සතිය දක්වා කාලය අතරතුර සිදුකරනු ලබයි.

#### Q: කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ප්‍රතිකාරයක්ද?

A: ඔබට GBS නිබේ නම් , දරු ප්‍රසූතිය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇත. ප්‍රසව වේදනාව ආරම්භවූ විට හෝ වෝටර් බ්‍රේක් වූ විට රෝහල් ගත කර සෑම පැය කිහිපයකට වරක් පෙනිසිලින් ප්‍රතිජීවකය ලබා දෙනු ඇත.

#### Q: දරුවාට ආසාදනය වුවහොත් කුමක් සිදුවේද?

A: දරුවන්ට නියුමෝනියාව හෝ මෙනින්ජයිටිස් වැනි බරපතල තත්වයන් ඇතිවී මියයා හැක. දරුවා ඉපදුණු විගස එයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීමේ ක්‍රමයක් ද ඇත. කෙසේ වෙතත් දරුවා බිහිකරන විට මවට ප්‍රතිජීවක ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.