

8

陣痛促進剤 (ප්‍රසව උත්තේජක)




出産のとき、自然に体からプロスタグランジンとオキシトシンというものがでて、それらによって陣痛(子宮の収縮)がおこります。

しかし、陣痛がはじまらなかったり、陣痛がはじまったけどよわかったり、ママや赤ちゃんのために早めに出産した方がよい状況のときは、陣痛促進剤がつかわれます。それは、人工的につくったプロスタグランジンとオキシトシンで、点滴することによって、陣痛がはじまったり、陣痛が強くなったりします。

Q:どんな薬ですか？

A: プロスタグランジン:点滴やのみ薬があります。薬のはたらきは、子宮の出口をやわらかくします。また、強い陣痛がおこることがあります。喘息の人には使えません。



A: オキシトシン:点滴です。子宮の出口をやわらかくするはたらきはありません。また、弱い陣痛しかおこらないこともあります。

状態にあわせてどちらかの薬が使われます。使い方のルールにあわせて薬は少しずつ使います。

දරු ප්‍රසූතියේදී ශරීරය ස්වභාවිකව ප්‍රොස්ටාග්ලන්ඩින් නම් සහ ඔක්සිටොසින් මුදා හරින අතර එය ප්‍රසව වේදනාව (ගර්භාෂය හැකිලීම) ඇති කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රසව වේදනාව ආරම්භ නොවූ , ප්‍රසව වේදනාව ආරම්භ වූ නමුත් ප්‍රසූත කිරීමට අපහසු කාන්තාවන්ට, දරු ප්‍රසූතිය ඉක්මන් කළ යුතු අවස්ථා වලදී ප්‍රසව උත්තේජකයක් භාවිතා කරයි. කෘතිමව නිපදවන ලද ප්‍රොස්ටාග්ලන්ඩින් සහ ඔක්සිටොසින් එන්නත් කිරීමෙන් ප්‍රසව වේදනාව ආරම්භ වී දරු ප්‍රසූතිය උත්තේජනය කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

Q: එය කුමන ආකාරයේ ඖෂධයක්ද?

A: ප්‍රොස්ටාග්ලන්ඩින් නම්: එන්නත් කරන සහ බොහෝ ඖෂධ ඇත.

ප්‍රසූත උත්තේජක මගින් ගර්භාෂය විවරය මෘදු කිරීම සිදුකරන අතර, ප්‍රසව වේදනාව වැඩි කරනු ලැබේ. අද්‍රුම ඇති කාන්තාවන්ට මේවා භාවිතා කළ නොහැකිය.



A: ඔක්සිටොසින්: එන්නත් කරන ඖෂධයකි. එය ගර්භාෂ විවරය මෘදු නොකරයි. එසේම දුර්වල ප්‍රසව වේදනා පමණක් සිදු වේ.

අවස්ථාව අනුව භාවිතා කරන ඖෂධ වර්ගය සහ භාවිතා කරන ආකාරය වෙනස් වේ.



また、陣痛が弱いままで強くならないときは、出産までに時間がかかり、赤ちゃんの状態が悪くなりますし、ママもとても疲れてしまいます。



点^{てん}滴^{てき}をしても効^{こう}果^{くわ}がでないことがあります。あまりない
ことですが、陣^{じん}痛^{つう}促^{そく}進^{しん}剤^{ざい}によって陣^{じん}痛^{つう}が強^{つよ}くなりすぎた
り、子^し宮^{きゅう}が破^は裂^{れつ}したりする可^か能^{のう}性^{せい}もありま^すす。そうならい
た^ために、陣^{じん}痛^{つう}促^{そく}進^{しん}剤^{ざい}を使^{つか}うときは、必^{かな}ずル^るール^るに沿^そって
使^{つか}わ^れていま^すす。



එසේම ප්‍රසව වේදනාව දුර්වල වීට ප්‍රසූතියට බොහෝ කාලයක් ගතවනු ඇත. එවිට දරුවාගේ තත්වය අයහපත් අතට පත්වනවා මෙන්ම මවද ඉතා වෙහෙසට පත් වනු ඇත. එහිදී ප්‍රසව උත්තේජක ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.



A: බලපෑම් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වේ. ඇතැම් අවස්ථාවල ප්‍රසව උත්තේජක භාවිතා කලත් එය ප්‍රතිඵලදායක නොවනු ඇත. ප්‍රසව උත්තේජක මගින් ප්‍රසව වේදනාව ඉතා ශක්තිමත් කිරීම නිසා ගර්භාෂය කැඩී යාමට හේතු විය හැක. එමනිසා වේදනා උත්තේජක භාවිතා කරන විට සෑම විටම නිවැරදි මාත්‍රාව භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.