



出産のあとは、とても忙しくて疲れやすい日々になります。

なぜならママの体は出産ですごく疲れているのに、赤ちゃんはママの気持ちやスケジュールなんか関係なく泣いて、何かを知らせようとするからです。

例えば、おむつがぬれていたり、おなかがすいていたり、ただ泣きたかったり…。

おむつをかえて、授乳をしてまたおむつをかえて寝かしつけるともう次の授乳…といった感じに、時間はどんどん流れていきます。

あわただしく、疲れがたまると気分が落ちこんで、イライラしたり、涙がでてしまったりすることがあるでしょう。でもそれはだれもが経験することです。赤ちゃんのお世話がうまいかないのはあたり前！親子といっても、はじめて出会ったふたりです。気持ちをつかむまでは時間がかかるのです。赤ちゃんが泣いてもそんなにあせらずに、自分なりの赤ちゃんとのつきあい方をさがしてください。

一人でがんばらず、まわりのサポートをうけましょう！

දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු ඔබ ඉතා කාර්යබහුල වන අතර වෙහෙසට පත්වනු ඇත.

දරු ප්‍රසූතියේදී මවගේ ශරීරය වෙහෙසට පත් වී ඇති නමුදු මවගේ හැඟීම් නොතකා දරුවා අඩයි. ඒ ඔබට යම් දෙයක් දැනුම්දීමට විය හැකිය.



නිදසුනක් ලෙස ඩයපර් තොත්වී හෝ බඩගිනිවී එසේත් නැතහොත් අඩන්න අවශ්‍ය වී.....





ඩයපර් මාරු කර, කිරි දී, නැවතත් ඩයපර් මාරු කර නිදි කෙරෙවුවාට පසුව නැවතත් කිරි දෙන වෙලාව.. ආදී ලෙස කාලය ගෙවී යයි.



ඔබ වෙහෙසට පත්ව, ඔබට මානසික අවපීඩනය, කෝපය, හඬා වැලපෙන අවස්ථා පවා තිබෙන්නට පුළුවනි. නමුත් සෑම දෙමවුපියෙක්ම අත්විඳින්නේ එයයි. දරුවාගේ වැඩකටයුතු නිවැරදිව කිරීමට නොහැකිවීම අතිශය සාමාන්‍ය දෙයකි. දෙමා පියන් ලෙස මෙය ඔබගේ පුළුම අත්දැකීමයි. එමනිසා මෙයට අනුගතවීමට ඔබට යම්කිසි කාලයක් ගතවේ. දරුවා ඇඬුවත්, කලබල නොවී දරුවා හදාවඩා ගැනීමට ඔබේම මාර්ගයක් සොයා ගැනීමට කාලයන් සමඟ ඔබට හැකිවනු ඇත.

ඔබ තනිවී නොමැත. තනිවම උත්සාහ නොකර, ඔබ වටා සිටින අයගේ සහාය ලබා ගන්න!

ひにんほうほう 避妊方法		いつから？
男性 だんせい	コンドーム 	セックスのとき
	手術 	いつでも可能
女性 じょせい	IUD 	<ul style="list-style-type: none"> ・出産のあと、2カ月すぎ てから ・妊娠していないことを確認 してから
	ピル 	<ul style="list-style-type: none"> ・できれば出産のあと 6 ヶ 月すぎから ・出産のあと 6 週間~6 か 月間で、ほかの避妊方法が 使用できないとき

ひにんほうほう 避妊方法		いつから？
女性 じょせい	バツサリー 	出産のあと、2カ月すぎ てから
	手術 	<p>経膣分娩のひと</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出産のあと2~3日あと <p>帝王切開のひと</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手術中におこなう

උපත් පාලන ක්‍රමය		භාවිතා කළ යුතු ආකාරය
පිරිමි	කොන්ඩම් 	ලිංගිකව හැසිරෙන විට
	සැත්කම් 	අවශ්‍යය වූ විට
ගැහැණු	IUD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ප්‍රසූතියෙන් මාස 2 කට පසු ・නව්‍ය ගැබ්ගැනීමක් සිදුවී නැතිද යන්න පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව සිදුකරයි
	පෙති 	<ul style="list-style-type: none"> ・ප්‍රසූතියෙන් මාස 6ක් ගතවූ පසු ・ප්‍රසූතියෙන් පසු සති 2 සිට මාස 6 දක්වා කාලය අනුලන වෙනත් උපත් පා ලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට නොහැකි නම් පමණක්

උපත් පාලන ක්‍රමය		භාවිතා කළ යුතු ආකාරය
ගැහැණු	පෙසරිය 	<ul style="list-style-type: none"> ・ප්‍රසූතියෙන් මාස 2ක් ගතවූ පසු
	සැත්කම් 	<p>ස්වභාවික දරු</p> <ul style="list-style-type: none"> ප්‍රසූතියක් කළ මවක් ප්‍රසූතියෙන් දින 2 හෝ 3ක් ගතවූ පසු <p>සිසේරියන් සැත්කමක් කළ මවක්</p> <ul style="list-style-type: none"> සැත්කම අතරතුරදීම සිදුකරයි